

ZVLÁDNUTIE CESTY K ÚSPECHU

Liečba závislosti od alkoholu prípravkom Adepend®



- ▶ znižuje túžbu po alkohole
- ▶ redukuje počet dní s príjmom alkoholu a znižuje množstvo požitého alkoholu¹
- ▶ znižuje riziko recidívy
- ▶ zvyšuje počet dní bez požitia alkoholu

Zlepšuje adherenciu k liečbe **pri dávkovaní jednej tablety denne**

Naltrexón má preukázanú účinnosť a je odporúčaný ako liečba prvej línie²

1. Jarosz J, Miernik K, Wąchal M, Walczak J, Kruppl G. Naltrexone (50mg) Plus Psychotherapy in Alcohol-Dependent Patients: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Drug Alcohol Abuse. 2013;39(3):144-160.
2. Crowley P. Long-term drug treatment of patients with alcohol dependence. Australian Prescriber. 2015;38(2):41-43.

Skrátená informácia o lieku:

Adepend® 50 mg filmom obalené tablety

Zloženie lieku: Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg naltrexóniumchloridu. **Terapeutické indikácie:** Adepend® sa používa ako súčasť komplexného liečebného programu proti alkoholizmu, na zníženie rizika recidívy, ako podporná liečba pri abstíncii a na zníženie chuti na alkohol. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Pred liečbou je potrebné potvrdiť, že pacient nemá v sebe žiadne opioidy napríklad na základe naloxónového testu. **Použitie u dospelých:** Liečba Adependom® 50 mg filmom obalenými tabletami má byť začatá a sledovaná kvalifikovaným lekárom. Odporúčaná dávka naltrexóniumchloridu u dospelých je 50 mg denne (1 tableta denne). **Použitie u detí a dospievajúcich (< 18 rokov):** Adepend® 50 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov v tejto indikácii kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na naltrexóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Akútna hepatitída. Závažné alebo akútne poškodenie pečene. Závažné poškodenie obličiek. Pacienti užívajúci opioídne analgetiká. Pacienti závislí od opioidov, keďže sa môžu objaviť abstinenčné príznaky. Pacienti s abstinenčnými príznakmi po podaní naloxóniumchloridu (pozitívna naloxónového provokačného testu). Pozitívny test v moči na opioidy. **Liekové a iné interakcie:** Klinické skúsenosti a výskumné údaje o účinku naltrexónu na farmakokinetiku iných látok sú v súčasnosti obmedzené. Súbežná liečba naltrexónom a inými liekmi má byť vykonávaná opatrne a starostlivo sledovaná. Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. **Nežiaduce účinky:** **Veľmi časté:** nervozita, úzkosť, poruchy spánku, nespavosť, bolesť hlavy, nepokoj, bolesť brucha, kŕče v bruchu, nevoľnosť, vracanie, artralgie a myalgie, asténia. Časté: zníženie chuti do jedla, iritabilita, afektívna porucha, vyčerpanosť, závrat, omámenie, zvýšená sekrécia slz (lakrimácia), tachykardia, srdcové palpitácie, anomálie EKG, bolesť na hrudníku, dyspnoe, hnačka, zápcha, dermatitída, svrbenie, vyrážka, retencia moču, oneskorená ejakulácia, znížená potencia, poruchy libida, smäd, zvýšená energia, chudnutie, príberanie váhy, horúčka, bolesť, pocit studených končatín, horúce návaly, triaška, hyperhidróza. **Menej časté:** Opar úst, tinea pedis, lymfadenopatia, halucinácie, zmätenosť, skleslosť, depresia, paranoja, dezorientácia, nočné mory, agitácia, neobvyklé sny, poruchy zraku, iritácia a opuch oka, svetloplachosť, lešť očí alebo únava, farebná, astenopia, diskomfort, bolesť uší, tinitus, závrat, edém, hypertenzia, zmeny krvného tlaku, návaly, opuch nosa, diskomfort nosa, zvýšený výtok z nosa, kýchanie, poruchy orofaryngu, zvýšená tvorba hlienov, poruchy dýchania, dysfónia, kašeľ, zívanie, plynatosť, hemoroidy, vred, sucho v ústach, poruchy pečene, zvýšená hladina bilirubínu, hepatitída (Počas liečby môže dôjsť k zvýšeniu transamináz. Po ukončení užívania lieku Adepend® sa hladina transamináz v priebehu niekoľkých týždňov vráti k pôvodným hodnotám.), seborea, akné, alopecia, bolesti slabín, polakizúria, dyzúria. **Zriedkavé:** idiopatická trombocytopenia, myšlienky na samovraždu, pokus o samovraždu, poruchy reči, synkopa, rabdomyolýza. **Veľkosť balenia:** 28 filmom obalených tabliet. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH, Wintergasse 85/1B, 3002 Purkersdorf, Rakúsko. **Registračné číslo:** 19/0391/10-S. **Dátum revízie textu:** 10/2013. **Dátum prípravy:** 09/2015. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Kontaktná adresa: Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150 Viedeň, Rakúsko.

NTX06c-0916 SK





AOP ORPHAN
FOCUS ON RARE DISEASES

SÚSTREDÍME SA NA Zriedkavé choroby

AOP Orphan je európskym priekopníkom v oblasti zriedkavých chorôb, vo výskume, vývoji, výrobe a distribúcii inovatívnych riešení na celom svete od roku 1996.

WWW.AOPORPHAN.COM

AOP Orphan Pharmaceuticals AG org. zložka
ABC II, Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Tel: 02/455 231 26, e-mail: office.sk@aoporphan.com